

高分子化学部分(50分)

一、名词解释(10分，每小题2分)

1. 官能团等活性概念
2. 调聚反应
3. 立构选择性聚合
4. 降解与共聚
5. 异构化聚合反应

二、选择题(12分，每小题2分)

1. O-e 概念可以用于
 - A. 预测单体共聚合反应的竞聚率
 - B. 计算自由基的平均寿命
 - C. 预测凝胶点
 - D. 计算共聚物的组成
2. 当乳液聚合反应进入第二阶段后，若补加一定量的引发剂，将会出现
 - A. 聚合速率增大
 - B. 聚合速率不变
 - C. 聚合物分子量增大
 - D. 聚合物分子量不变
3. 丁烯用 $\text{AlCl}_3\text{-H}_2\text{O}$ 引发聚合反应时，最为适合的溶剂是
 - A. 二氯甲烷
 - B. 四氢呋喃
 - C. 乙酸乙酯
 - D. 苯甲醚
4. 在下列聚合反应体系中，当 $p = 1, r = 1$ 时，预测聚合物分子量分布最窄的是
 - A. 对苯二甲酸 + 对羟基苯甲酸
 - B. 对羟基苯甲酸
 - C. 均苯四甲酸 + 对羟基苯甲酸
 - D. 均苯三甲酸 + 对羟基苯甲酸
5. 丁基橡胶通常用硫磺作硫化剂，而不用过氧化物，这是因为过氧化物
 - A. 产生的自由基会引起链断裂发生降解
 - B. 反应不易控制
 - C. 毒性大
 - D. 难以发生交联反应
6. 欲在 30°C 下进行苯乙烯的本体聚合反应，引发剂应选择
 - A. BPO
 - B. AIBN
 - C. 过氧化氢 + FeSO_4
 - D. BPO + 二甲基苯胺

三、问答题(10分，每小题5分)

1. 聚合反应中如何控制聚合物分子量是一个十分重要的问题，试问缩聚反应通常可采用哪些方法对分子量进行控制？各有何优、缺点？
2. 环氧乙烷、环氧丙烷和四氢呋喃都是环醚单体，前二者均可进行阴离子开环聚合反应，为什么四氢呋喃不能？当用醇钠作引发剂时，环氧乙烷阴离子开环聚合能获得高分子量聚合物，环氧丙烷聚合物的分子量则很低。这是为什么？用何种引发剂(阴离子聚合机理)才能生成高分子量聚环氧丙烷？

四、计算题(10分)

高参考价值的真题、答案、学长笔记、辅导班课程，访问：[www kaoyancas.net](http://www kaoyancas net)
苯乙烯在四氢呋喃溶剂中以氯化铁作催化剂，25℃下聚合，苯乙烯和氯化铁浓度分别为1M和0.001M。反应6秒钟后，苯乙烯浓度降到 2.5×10^{-3} M。计算：

- (1) 聚合反应速率
- (2) 增长速率常数
- (3) 反应6秒后聚合物的数均聚合度

五、用适当单体合成下列聚合物，写出反应方程式，并注明引发剂体系及必要的反应条件(8分，每小题4分)。

1. 聚碳酸酯
2. 维尼纶

高分子物理部分(50分)

一、名词解释(10分)

- | | | |
|-----------|------------|-------|
| 1. 银纹 | 2. 扩张因子 | 3. 细颈 |
| 4. 普适校正曲线 | 10. 聚合物驻极体 | |

二、为什么把高分子链称为“高斯链”？高斯链与自由结合链的差别？在什么条件下高分子链呈现为高斯链？(15分)

三、高聚物高弹性的特点是什么？本质是什么？举出两种典型的反映高聚物高弹性力学行为。(15分)

四、指出重均分子量和数均分子量最重要的测定方法各一种。它们适用的分子量范围。可用它们测定哪些力学参数和分子参数？(10分)

完整版，请访问[www kaoyancas.net](http://www kaoyancas net) 科大科研院考研网，专注于中科大、中科院考研